



Ectodex[®] –

**Demodex-Räude
beim Hund**

Information für die Tierarztpraxis



utensilien ectodex



Ihr Hund leidet unter Demodex-Räudemilben. Mit Ectodex® wird es ihm bald wieder besser gehen.

Ectodex® ist ein hochwirksames Mittel zur äußeren Anwendung. Es riecht ziemlich stark. Aber keine Angst – es schadet weder Ihnen noch Ihrem Tier.

Zunächst einmal brauchen Sie folgende Utensilien:

- Eimer
- Schwamm
- Gummihandschuhe mit langem Schaft
- Falls Ihr Hund am Kopf behandelt werden muss: Augensalbe für Ihren Hund (bitte vor der Behandlung als Schutz einbringen)
- Eventuell eine Halskrause für die Trockenphase

Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sollten Sie wie folgt vorgehen:

Bitte ziehen Sie zunächst die Handschuhe an. Mischen Sie dann Ectodex® nach der Empfehlung Ihres Tierarztes mit einer entsprechenden Menge Wasser (z. B. bei einer Ganzkörperanwendung: 1 Fläschchen Ectodex® auf 5 l handwarmes Wasser).

behandlung
ectodex



Am besten nehmen Sie die Behandlung in einem Raum mit Bodenabfluss oder in einer Duschwanne vor. Stellen Sie den Behälter mit der gebrauchsfertigen Lösung in eine Ecke, so dass er nicht versehentlich umgestoßen werden kann.

**Wenn das Fell Ihres Hundes stark verschmutzt ist, können Sie ihn zuvor shampooo-
nieren.** Achten Sie dann aber bitte darauf, dass im Fell keine Shampooreste zurückbleiben. Anschließend können Sie die Lösung auf das noch feuchte Fell auftragen.

Ansonsten wird das trockene Fell mit Ectodex[®] behandelt:

Die Lösung wird mit einem Schwamm entgegen der Haarrichtung eingerieben – entweder auf die betroffenen Stellen oder auf das ganze Tier, je nach Anweisung des Tierarztes. Ectodex[®] wird nicht ausgespült.



besserung
ectodex

Reiben Sie Ihren Hund bitte anschließend mit einem Handtuch ab und lassen Sie sein Fell an einem warmen, zugluftfreien Platz trocknen. Bitte nicht fönen! Solange das Fell feucht ist, sollten Sie Ihren Hund am Ablecken hindern (entweder durch Spielen ablenken oder eine Halskrause anbringen).

Reste der Lösung werden in kurzer Zeit unwirksam, deshalb bitte in die Toilette entsorgen und beim nächsten Mal frisch zubereiten.

Bitte verlieren Sie nicht die Geduld, wenn Sie nicht gleich eine Besserung feststellen. Die diagnostizierte Erkrankung erfordert eine wochen- bis monatelange Behandlung in regelmäßigen Abständen (ca. 5–7 Tage, je nach Verordnung Ihres Tierarztes). Damit es für Sie einfacher ist, finden Sie auf der Seite 10 eine Übersicht, um die Behandlungstage einzutragen.



untersuchung
ectodex

Wenn die Symptome abgeklungen sind, führen Sie die Anwendungen bitte unbedingt noch ca. 3 Wochen lang fort, um einen Rückfall zu verhindern.

Sollte Ihr Tier das Arzneimittel nicht vertragen, eine zu hohe Dosis abbekommen oder versehentlich davon geschluckt haben, können Schläfrigkeit, Erbrechen oder Durchfall auftreten. Bitte wenden Sie sich dann gleich an Ihren Tierarzt, der ein Antidot (Gegenmittel) verabreichen kann.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gute Besserung für Ihren Hund.

Bitte denken Sie auch an den Nachuntersuchungstermin bei Ihrem Tierarzt – damit Sie ganz sicher sein können, dass Ihr Hund wieder gesund ist.

An diesen Tagen haben Sie Ihren Hund mit Ectodex® behandelt:

	1. Woche	2. Woche	3. Woche	4. Woche	5. Woche	6. Woche
Mo:						
Di:						
Mi:						
Do:						
Fr:						
Sa:						
So:						

Ectodex®

Für Tiere: Hunde. **Wirkstoff:** 1 ml Ectodex® enthält 50mg Amitraz. **Anwendungsgebiete:**

Zur Behandlung der Demodex-Räude (Demodikose) beim Hund. **Gegenanzeigen:** Bradykardie, Glaukom. Ectodex® ist nicht geeignet zur Behandlung von Chihuahuas, Hunden, die unter Hyperthermie leiden, trächtigen oder säugenden Hündinnen und Welpen, die jünger als 3 Monate sind. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Nebenwirkungen: Ectodex® verursacht bei bestimmungsgemäßer Anwendung nur selten Nebenwirkungen, gelegentlich kann es aufgrund der alpha-2-adrenorezeptoragonistischen

Wirkung jedoch zu einer leichten, vorübergehenden Sedierung kommen, zum Beispiel bei stark geschwächten Tieren. Es erfolgt eine spontane Erholung. Im Falle einer unbeabsichtigten Überdosierung sind die unter „Hinweise für den Fall einer Überdosierung“ genannten Angaben zu beachten. **Handels-**

formen: 6 Flaschen zu 50 ml.

Verschreibungspflichtig.



Praxisstempel

Bitte Nachuntersuchungstermin nicht vergessen!